Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXVII, n° 50.
Bruxelles, août 1951.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXVII, nr 50.
Brussel, Augustus 1951.

NOTES SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE.

IX. — Description de trois Oiseaux nouveaux du Katanga (Congo belge),

par René Verheyen (Bruxelles).

Fam. *PYCNONOTIDÆ.*

Nicator chloris katangensis subsp. nov.

Description : quant au plumage, ressemble à *N. chl. chloris* (Valenciennes), mais de taille plus grande.

Longueur de l'aile de neuf mâles adultes : 110-115 mm (en moyenne 112 mm).

Type : n° 3094, Rivière Munoï, sous-affluent de la Lufira, rive droite, altitude 890 m, Parc National de l'Upemba ; mâle adulte ; longueur de l'aile : 112 mm et du culmen : 21 mm. Collection : Mission G. F. de Witte au P. N. U. 1947-1949 (Institut des Parcs Nationaux du Congo belge).

Habitat : les galeries forestières importantes dans les basses et les moyennes altitudes (600 à 1.400 m) du Parc National de l'Upemba.

Fam. *TIMALIIDÆ*.

Ptyrticus turdinus upembæ subsp. nov.

Description : diffère de *P. t. turdinus* Hartlaub et de *P. t. harterti* Grote quant aux parties supérieures de la tête et du corps, ainsi qu'aux taches de la gorge dont le teint dominant est plus brun, moins rougeâtre. Il est à remarquer que les sujets en plumage juvénile sont, pour la coloration générale, identiques à *P. t. turdinus* Hartlaub.

Type : n° 3020, lieu-dit Kabwe sur la Muyé, affluent de la Lufira, rive droite, altitude 1.400 m, 13-V-1948 ; mâle adulte ; longueur de l'aile : 95 mm et du culmen : 19 mm. Collection : Mission G. F. de Witte au P. N. U. 1947-1949 (Institut des Parcs Nationaux du Congo belge),

J'exprime mes sincères remerciements à M. R.-E. Moreau d'avoir bien voulu vérifier le diagnostic de cette sous-espèce nouvelle.

Habitat : la savane arbustive à proximité des galeries forestières.

Fam. *COLIIDÆ*.

Urocolius indicus lualabæ subsp. nov.

Description : front beige ; vertex, nuque, sus-alaires, manteau, dos et croupion vert-gris pâle, le vertex faiblement teinté de beige, le dos et le croupion plus clairs que le manteau ; menton blanc, teinté d'isabelle ; gorge et poitrine vert-gris pâle teinté de beige ; abdomen beige grisâtre.

Se distingue de *U. i. angolensis* Reichenow, qui a le front gris pâle et de *U. i. pallidus* Reichenow, qui est plus petit (longueur de l'aile : 83-85 mm) et qui a la région auriculaire teintée plus distinctement de verdâtre.

Type : I. G. 17360, n° 8 ; Mulumbu Kazadi (district Lualaba) ; 12-IV-1949 ; mâle adulte en plumage frais ; longueur de l'aile : 95 mm, de la queue : 216 mm et du culmen : 14 mm. Collection : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Digitized by the Internet Archive
in 2023

https://archive.org/details/bulletin-institut-royal-sciences-naturelles-belgique_1951-08_27_50

Ad. Goemaere, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles